

# ТЕРЖИНАН 10 ДНЕЙ – НАДЕЖНОЕ И БЕРЕЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАГИНИТА<sup>1</sup>

Отпускается по рецепту



РУ ЛП-№(001203)-(РГ-РУ) от  
13.09.2022



**ТЕРЖИНАН ПОМОГАЕТ БОЛЕЕ 2,7 МЛН ЖЕНЩИН В РФ ЕЖЕГОДНО<sup>2</sup>**

1. В.Н.Прилепская, Е.А.Межевитинова, П.Р.Абакарова, Т.В.Бровкина, Ш.М.Погосян . Лечение вульвовагинитов и вагинозов: клиничко-лабораторная эффективность. Гинекология. 2013; 4: 4-9
2. IQVIA report 2017-2023г среднегодовые продажи Тержинана 2,7 млн упаковок в год


МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

# ВАГИНИТ – ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ВЛАГАЛИЩА, НАРУШАЕТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ<sup>1</sup>

## ВЫ УЗНАЕТЕ ЭТИХ ЖЕНЩИН-ПОКУПАТЕЛЕЙ?



Патологические  
выделения, **ЗУД**, жжение,  
дискомфорт в интимной зоне




ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ  
ВЫДЕЛЕНИЯ:  
ОБИЛЬНЫЕ, С ЗАПАХОМ



ДИСКОМФОРТ В  
ИНТИМНОЙ ЗОНЕ:  
ЗУД, ЖЖЕНИЕ

- Снижение качества жизни
  - Проблемы с партнером
- Трудности в контакте с людьми
- Личностные и психологические проблемы

# ВАГИНИТ – СЕРЬЕЗНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ



- У женщин с вагинитом в **2 раза чаще** развивается **эндометрит\*<sup>1</sup>**.
- **Ухудшается прогноз при беременности:** возрастает угроза преждевременных родов, невынашивания, повышение риска травмы промежности в родах<sup>2</sup>, послеродовый эндометрит, субинволюция\*\* матки<sup>3</sup>
- Восходящая инфекция чревата **воспалительными заболеваниями органов малого таза<sup>4</sup>**
- Вагинит может привести к отдаленным последствиям: **бесплодию, внематочной беременности<sup>4</sup>**

\*Эндометрит – воспаление матки

\*\*Субинволюция матки – патология, при которой матка плохо восстанавливается после родов

1. Lin WC, Chang CY, Hsu YA, Chiang JH, Wan L. Increased Risk of Endometriosis in Patients With Lower Genital Tract Infection: A Nationwide Cohort Study. *Medicine (Baltimore)*. 2016;95(10):e2773

2. Ng BK, Chuah JN, Cheah FC, et al. Maternal and fetal outcomes of pregnant women with bacterial vaginosis. *Front Surg*. 2023;10:1084867.

3. Шульженко Екатерина Валерьевна, Зарицкая Элеонора Николаевна, Мирлас Елена Михайловна, Борзунов Максим Николаевич, Мостовая Тамара Алексеевна, Болгова Елена Дмитриевна, and Петров Сергей Николаевич. "Субинволюция матки и послеродовый эндометрит" *Амурский медицинский журнал*, no. 2 (6), 2014, pp. 97-100.

4. Mastromarino, P.; Hemalatha, R.\*; Barbonetti, A.\*\*; Cinque, B.†; Cifone, M.G.†; Tamaro, F.; Francavilla, F.\*\*. Biological control of vaginosis to improve reproductive health. *Indian Journal of Medical Research* 140(Suppl 1):p S91-S97, November 2014.

# ВАГИНИТ ВОЗНИКАЕТ ПРИ НАРУШЕНИИ БАЛАНСА МИКРОФЛОРЫ ВЛАГАЛИЩА: УВЕЛИЧЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ И УМЕНЬШЕНИИ ЛАКТОБАКТЕРИЙ



Норма:  
преобладают  
лактобактерии



Вагинит:  
преобладают патогенные  
микробы

- В 90% случаев при вагините обнаруживают **комбинацию нескольких микроорганизмов**
- Поэтому препарат для лечения вагинита должен обладать **максимальным спектром** действия против основных возбудителей
- В зависимости от преобладания вида патогенных микроорганизмов выделяют:
  - кандидозный вульвовагинит
  - бактериальный вагиноз
  - неспецифический вагинит
  - смешанный вагинит

# ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРЖИНАНА ОБУСЛОВЛЕНА МАКСИМАЛЬНЫМ СПЕКТРОМ АКТИВНОСТИ<sup>1</sup> ПРОТИВ ОСНОВНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ВАГИНИТОВ<sup>2</sup>

	Анаэробы ( <i>Gardnerella vaginalis</i> )	Стрептококки (Гр +)	Грам –	Грибы ( <i>Candida</i> )	Простейшие (Трихомонада)
<b>Тержинан<sup>2</sup></b> (Неомицин+Нистатин+ Преднизолон+Тернидазол)	+	+	+	+	+
Полимиксин В + неомицин + нистатин ( <b>Полижинакс<sup>3</sup></b> )	+	+	+	+	-
Метронидазол + миконазол ( <b>Нео- Пентран<sup>4</sup>, Клион<sup>5</sup>-Д 100<sup>5</sup></b> )	+	+/-	-	+	+
Орнидазол+ Неомицин + Эконазол + Преднизолон ( <b>Эльжина<sup>6</sup></b> )	-	+	+	+	+
Бутоконазол + Клиндамицин ( <b>Клиндацин Б пролонг<sup>7</sup></b> )	+	+/-	-	+	-

1. Сидорова И.С., Боровкова Е.И. Результаты сравнительного исследования эффективности применения препаратов местного действия в терапии неспецифических воспалительных заболеваний влагалища
2. Общая характеристика лекарственного препарата Тержинан от 13.09.2022, <http://eec.eaeunion.org/>
3. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Полижинакс®, РУ П N011782/01 от 11.03.2010;
4. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Нео-Пентран® РУ П N014405/01 от 13.08.2008 : фармакологическое действие миконазола на Гр+ флору распространяется на *Cryptococcus neoformans*, *Coccidioides immitis*, *Paracoccidioides brasiliensis*, которые не являются основными патогенами гнойно-воспалительных заболеваний, а именно – стрептококками и стафилококками, которые указаны в заголовке в таблице.
5. Общая характеристика лекарственного препарата Клион®-Д 100 от 27.12.2023, <http://eec.eaeunion.org/>
6. Общая характеристика лекарственного препарата Эльжина® от 04.12.2023, <http://eec.eaeunion.org/> : фармакологическое действие распространяется на некоторые виды анаэробов: *Bacteroides* spp., *Clostridium* spp., *Fusobacterium* spp., *Peptostococcus* spp., но не *Gardnerella vaginalis*, которая играет решающую роль в развитии бактериального вагиноза
7. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Клиндацин Б пролонг, РУ ЛП-001855 от 27.09.2012

# ТЕРЖИНАН 10 ДНЕЙ – НАДЕЖНОЕ И БЕРЕЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАГИНИТОВ И ЗАЩИТА ОТ РЕЦИДИВОВ<sup>1</sup>

- Высокая эффективность лечения вагинита при применении Тержинана курсом 10 дней<sup>1</sup>
- Минимальное количество рецидивов через 6 месяцев<sup>1</sup>




# ТЕРЖИНАН - ЛИДЕР РЫНКА, САМЫЙ ЧАСТО НАЗНАЧАЕМЫЙ ВРАЧАМИ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВАГИНИТА<sup>1</sup>

- Уменьшает симптомы уже с первого дня лечения<sup>2</sup>
- 99% выздоравливают после однократного курса<sup>3</sup>
- Действует только местно<sup>4</sup>, разрешен при беременности<sup>5</sup>




1. IQVIA report, 2023, Prindex 3Q'2023  
2. Сидорова И.С., Боровкова Е.А. Результаты сравнительного исследования эффективности применения препаратов местного действия в терапии неспецифических воспалительных заболеваний влагалища. «Российский вестник акушера-гинеколога», том 7, №3, 2007, стр.63-66  
3. В.Н.Прилепская, Е.А.Межевитинова, П.Р.Абакарова, Т.В.Бровкина, Ш.М.Погосян . Лечение вульвовагинитов и вагинозов: клиничко-лабораторная эффективность. Гинекология. 2013; 4: 4-9  
4. Е.И.Боровкова, Г.В.Раменская. Оценка эффективности и безопасности местной терапии неспецифических вагинитов/ Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2014, т. 13, №4, с. 19–23  
5. Общая характеристика лекарственного препарата Тержинан от 13.09.2022, <http://eec.eaeunion.org/>

# ТЕРЖИНАН МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ДАЖЕ ДО ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МАЗКОВ<sup>1,2</sup>



Мне назначили Тержинан.  
Можно ли его заменить?



У Тержинана нет аналогов<sup>5</sup>.  
Другой препарат может не подействовать,  
и возникнет рецидив.  
Для полного курса лечения возьмите  
2 уп Тержинана №6.

**Применяется при  
любом вагините:**  
кандидозный, смешанный,  
неспецифический вагинит,  
бактериальный вагиноз<sup>3</sup>

**Комплексный состав<sup>3</sup>:**  
2 антибиотика, антимикотик,  
преднизолон\*

**Широкий  
антимикробный спектр и  
противовоспалительное  
действие<sup>3,4</sup>**

1. Клинические рекомендации «Воспалительные болезни шейки матки, влагалища и вульвы», 2021г [https://roag-portal.ru/projects\\_gynecology](https://roag-portal.ru/projects_gynecology)  
2. Радзинский В.Е. Эмпирическая терапия вульвовагинитов у женщин репродуктивного возраста в рутинной клинической практике. Акушерство и гинекология. 2020. 2:160-8.  
3. Общая характеристика лекарственного препарата Тержинан от 13.09.2022, <http://eec.eaeunion.org/>  
4. Доброхотова Ю.Э., Боровкова Е.И., Романовская В.В., Зайдиева З.С., Степанянц И.В. Целесообразность профилактической санации влагалища перед проведением биопсии шейки матки. Акушерство и гинекология. 2020; 9: 146-15  
5. IQVIA report, 2023, Prindex 3Q'2023  
\* Преднизолон MSB



# ТЕРЖИНАН – ЕДИНСТВЕННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ, РАЗРЕШЕННЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ У БЕРЕМЕННЫХ НА ВСЕХ СРОКАХ И НЕ ИМЕЮЩИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ<sup>1</sup>

	Возможность применения			Лекарственные и другие взаимодействия
	1 триместр беременности	2-3 триместр беременности	Лактация	
<b>Тержинан<sup>1</sup></b> (Неомицин+Нистатин+ Преднизолон+Тернидазол)	<b>Польза/риск</b>	<b>+</b>	<b>Польза/риск</b>	<b>Не выявлено</b>
Полимиксин В + неомицин + нистатин (Полижинакс <sup>2</sup> )	<b>Нет</b>	<b>Нет</b>	<b>Нет</b>	Спермициды
Метронидазол + миконазол (Нео-Пенотран <sup>3</sup> )	<b>Нет</b>	<b>Польза/риск</b>	<b>Нет</b>	<b>Алкоголь</b> , презервативы, фентоин, фенобарбитал, дисульфирам, цимитидин, литий, астемизол, терфенадин, пероральные антикоагулянты
Орнидазол+ Неомицин + Эконазол + Преднизолон (Эльжина <sup>4</sup> )	<b>Нет</b>	<b>Нет</b>	<b>Нет</b>	Непрямые антикоагулянты: Варфарин, Аценокумарол
Бутоконазол + Клиндамицин (Клиндацин Б пролонг <sup>5</sup> )	<b>Польза/риск</b>	<b>Польза/риск</b>	<b>Нет</b>	Миорелаксанты периферического действия, Витамины В, ампициллин, кальция глюконат, магния сульфат, линкомицин, эритромицин, аминогликозиды

## ТЕРЖИНАН 10 ДНЕЙ – МАКСИМАЛЬНО БЕРЕЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАГИНИТА

1. Общая характеристика лекарственного препарата Тержинан от 13.09.2022, <http://eec.eaeunion.org/>  
2. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Полижинакс®, РУ П N011782/01 от 11.03.2010;  
3. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Нео-Пенотран® РУ П N014405/01 от 13.08.2008 : фармакологическое действие миконазола на Гр+ флору распространяется на Cryptococcus neoformans, Coccidioides immitis, Paracoccidioides brasiliensis, которые не являются основными патогенами гнойно-воспалительных заболеваний, а именно – стрептококками и стафилококками, которые указаны в заголовке в таблице.  
4. Общая характеристика лекарственного препарата Эльжина® от 04.12.2023, <http://eec.eaeunion.org/> : фармакологическое действие распространяется на некоторые виды анаэробов: Bacteroides spp., Clostridium spp., Fusobacterium spp., Peptostococcus spp., но не Gardnerella vaginalis, которая играет решающую роль в развитии бактериального вагиноза  
5. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Клиндацин Б пролонг. РУ ДП-001855 от 27.09.2012.

# ТЕРЖИНАН – МАКСИМАЛЬНО БЕРЕЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАГИНИТА, МИНИМУМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО МЕСТНО<sup>1</sup>

	Системное действие (абсорбция в системный кровоток)	Противопоказания
<b>Тержинан<sup>1</sup></b> (Неомицин+Нистатин+Преднизолон+Тернидазол)	<b>Нет</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата</li> </ul>
Полимиксин В + неомицин + нистатин <b>(Полижинакс<sup>2</sup>)</b>	<b>+</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Повышенная чувствительность к неомицину, нистатину, полимиксину В и другим компонентам препарата</li> <li>Одновременное использование с полиуретановыми презервативами или диафрагмами</li> <li>Аллергические реакции на арахис или сою</li> <li>Не рекомендуется использовать в сочетании со спермицидами</li> <li>Беременность</li> </ul>
Метронидазол + миконазол <b>(Нео-Пенотран<sup>3</sup>)</b>	<b>+</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Повышенная чувствительность к активным компонентам препарата или их производным</li> <li>1 триместр беременности,</li> <li>Период грудного вскармливания</li> <li>Порфирия</li> <li>Эпилепсия</li> <li>Тяжелые нарушения печени</li> <li>Девственница, возраст до 18 лет</li> </ul>
Орнидазол+ Неомицин + Эконазол + Преднизолон <b>(Эльжина<sup>4</sup>)</b>	<b>+</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Гиперчувствительность к орнидазолу, эконазолу и другим производным имидазола/нитроимидазола, неомицину и другим аминогликозидам, преднизолону, а также, к любому из компонентов, входящих в состав препарата</li> <li>Органические заболевания центральной нервной системы</li> <li>Заболевания органов кроветворения</li> <li>Беременность</li> <li>Период грудного вскармливания</li> <li>Детский возраст до 18 лет</li> </ul>


1. Общая характеристика лекарственного препарата Тержинан от 13.09.2022, <http://eec.eaeunion.org/>

2. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Полижинакс®, РУ П N011782/01 от 11.03.2014


3. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Нео-Пенотран® РУ П N014405/01 от 13.08.2008 : фармакологическое действие миконазола на Гр+ флору распространяется на Cryptococcus neoformans, Coccidioides immitis, Paracoccidioides brasiliensis, которые не являются основными патогенами гнойно-воспалительных заболеваний, а именно – стрептококками и стафилококками, которые указаны в заголовке в таблице.

4. Общая характеристика лекарственного препарата Эльжина® от 04.12.2023, <http://eec.eaeunion.org/> : фармакологическое действие распространяется на некоторые виды анаэробов: Bacteroides spp., Clostridium spp., Fusobacterium spp., Peptostococcus spp., но не Gardnerella vaginalis, которая играет решающую роль в развитии бактериального вагиноза

# ТЕРЖИНАН – МАКСИМАЛЬНО БЕРЕЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАГИНИТА, МИНИМУМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО МЕСТНО<sup>1</sup>



Мне назначили Тержинан.  
Можно ли его заменить?



У Тержинана нет аналогов<sup>3</sup>.  
Тержинан – единственный препарат,  
который можно применять **на всех сроках  
беременности**, который **действует местно**  
и имеет **минимум противопоказаний<sup>1</sup>**.  
Для полного курса лечения возьмите  
**2 уп Тержинана №6.**

Тержинан действует  
только местно<sup>2</sup>

Нет системных  
эффектов<sup>2</sup>

Можно применять при беременности,  
при сопутствующей патологии,  
нет лекарственных взаимодействий<sup>1</sup>

1. Общая характеристика лекарственного препарата Тержинан от 13.09.2022, <http://eec.eaeunion.org/>


2. Е.И.Боровкова, Г.В.Раменская. Оценка эффективности и безопасности местной терапии неспецифических вагинитов/ Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2014, т. 13, №4, с. 19–23

3. IQVIA report, 2023, Prindex 3Q'2023

# ТЕРЖИНАН КУРСОМ 10 ДНЕЙ СПОСОБСТВУЕТ РОСТУ ЛАКТОБАКТЕРИЙ – ОСНОВНЫХ ЗАЩИТНИКОВ ЗДОРОВЬЯ ВЛАГАЛИЩА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РЕЦИДИВОВ<sup>1</sup>

Лактобактерии поддерживают pH среды 4,0 – 4,5, что подавляет рост патогенных микроорганизмов


Динамика ДНК *Lactobacillus* spp. после лечения вагинита, ГЭ/мл



- После терапии Тержинамом через 30 дней количество лактобактерий увеличилось более чем в 10 раз<sup>1</sup>
- После терапии Гексиконом у 35% - нет роста лактобактерий, суммарный титр лактобактерий низкий  $\leq 4 \lg \text{КОЕ/мл}^1$

# ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВАГИНИТА НЕОБХОДИМО НЕ МЕНЕЕ 10 ДНЕЙ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ ТЕРЖИНАН<sup>1</sup>

Бактерии живут в составе биопленок<sup>2</sup>, которые укреплены несколькими уровнями защиты. Для их разрушения необходимо длительное воздействие высокими концентрациями антибиотиков: не менее 10 дней<sup>1,3</sup>




1. Стрижаков А.Н., Буданов П.В. Лечение вульвовагинальных инфекций с позиций доказательной медицины. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии 2015, т.14, №1, с69-74
2. Sousa LGV, Pereira SA, Cerca N. Fighting polymicrobial biofilms in bacterial vaginosis. Microb Biotechnol. 2023;16(7):1423-1437
3. Swidsinski A, Mendling W, Loening-Baucke V, et al. An adherent Gardnerella vaginalis biofilm persists on the vaginal epithelium after standard therapy with oral metronidazole. Am J Obstet Gynecol 2008;198:97.e1-97.e6.

# ТЕРЖИНАН 10 ДНЕЙ – НАДЕЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАГИНИТА С МИНИМАЛЬНЫМ РИСКОМ РЕЦИДИВОВ<sup>1</sup>


Уменьшение жалоб и нормализация микробиологических показателей начинаются уже с 1 дня приема препарата Тержинан<sup>1</sup>

Для микробиологического выздоровления необходим полный курс 10 дней<sup>1</sup>


Количество лейкоцитов в п/зр




Количество псевдомицелий *Candida spp.*, в п/зр




Количество микроорганизмов, в 1 мм<sup>2</sup> (исключая морфотип лактобацилл)



Количество ключевых клеток, в п/зр



An illustration of a pharmacy scene. On the left, a woman in a grey top and green shorts is talking to a pharmacist in a white lab coat. The pharmacist is standing behind a counter with shelves of various medicines. A thought bubble from the woman contains text about her symptoms. Another thought bubble from the pharmacist contains text about Terzhinan. At the bottom left, a red Mini SUV is shown. A green brushstroke background contains text about offering 2 packs of Terzhinan to customers.

Мне назначили Тержинан.  
Беспокоят выделения,  
**ЗУД, жжение,**  
дискомфорт в интимной  
зоне.

**Тержинан**

- Может **помочь** избавиться от неприятных ощущений уже с первого дня<sup>1</sup>
- и **защитить** от рецидивов<sup>2</sup>
- Для лечения возьмите **2 уп №6**

Каждый раз, когда к Вам приходит покупательница за Тержинаном, предложите ей сразу 2 уп №6

1. Сидорова И.С., Боровкова Е.А. Результаты сравнительного исследования эффективности применения препаратов местного действия в терапии неспецифических воспалительных заболеваний влагалища. «Российский вестник акушера-гинеколога», том 7, №3, 2007, стр.63-66

2. В.Н.Прилепская, Е.А.Межевитинова, П.Р.Абакарова, Т.В.Бровкина, Ш.М.Погосян . Лечение вульвовагинитов и вагинозов: клинико-лабораторная эффективность. Гинекология. 2013; 4: 4-9

# ЕСЛИ В АПТЕКЕ ДОСТУПЕН ТОЛЬКО ТЕРЖИНАН №6, ПРЕДЛОЖИТЕ ПОКУПАТЕЛЮ СРАЗУ 2 УПАКОВКИ



РУ ЛП-№(001203)-(PF-RU) от 13.09.2022

Мне назначили Тержинан.  
Дайте, пожалуйста.

Возьмите 2 уп Тержинана №6.  
Это – необходимый курс для  
лечения<sup>1</sup>





# ТЕРЖИНАН - УВЕЛИЧЕНИЕ ТОВАРОБОРОТА ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ



Широкий спектр




Проверен временем



Выгодно для аптеки



Произведено во Франции\*\*\*



Сохраняет здоровую микрофлору\*\*



Эффект независимо от вида вагинита\*



Покупатель доволен



Имидж препарата, которому можно доверять



Скорее согласится на покупку



Курс лечения 10 дней



Покупка 2 упаковок по 6 таблеток



Европейское качество



Уверенность покупателя



Защищает от рецидивов



Покупатель спокоен

\*Эффективность монотерапии бактериального вагиноза и урогенитального кандидоза Тержинамом – комбинированным препаратом местного действия, Липов Е.В., Храян Р.С./Российский вестник акушера-гинеколога 5, 2006

\*\*Савичева А.М., Мартикайнен З.М., Селимян Н.К./ Практикующий врач, 2004

\*\*\*Общая характеристика лекарственного препарата Тержинан от 13.09.2022, <http://eec.eaeunion.org/>

# ТЕРЖИНАН №6 2 УП – ВЫГОДНО ЛЕЧИТЬСЯ, ВЫГОДНО ПРОДАВАТЬ

## ВЫГОДА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦЫ


**Быстро. Надежно. Надолго**

- Устранение симптомов с 1-х дней лечения<sup>1</sup>
- Быстрое улучшение качества жизни<sup>1</sup>
- Можно использовать до получения результатов анализов<sup>2</sup>
- Восстановление лактофлоры без дополнительных затрат на пробиотики<sup>2</sup>
- Защита от рецидивов<sup>3</sup>
- Уменьшение затрат на анализы, повторное лечение, восстановление лактофлоры<sup>1-3</sup>

## ВЫГОДА ДЛЯ АПТЕКИ

**Прибыльный. Известный. Назначаемый**

- Каждая 5-я проданная упаковка для лечения вагинита – Тержинан\*
- Каждый 4-й рубль, потраченный на лечение вагинита – на Тержинан\*
- Люди ГОТОВЫ тратить деньги на Тержинан → поэтому аптеке легко на нем заработать\*
- Продажа 2 упак Тержинана №6 – грамотное лечение вагинита, выгодный вклад в выполнение плана аптеки



1. Сидорова И.С., Боровкова Е.А. Результаты сравнительного исследования эффективности применения препаратов местного действия в терапии неспецифических воспалительных заболеваний влагалища. «Российский вестник акушера-гинеколога», том 7, №3, 2007, стр.63-66

2. Радзинский В.Е. Эмпирическая терапия вульвовагинитов у женщин репродуктивного возраста в рутинной клинической практике. Акушерство и гинекология. 2020. 2:160-8.

3. В.Н.Прилепская, Е.А.Межевитинова, П.Р.Абакарова, Т.В.Бровкина, Ш.М.Погосян . Лечение вульвовагинитов и вагинозов: клиничко-лабораторная эффективность. Гинекология. 2013; 4: 4-9

\* доля рынка Тержинана 19% в уп, 27% в руб (IQVIA, декабрь 2023)

# ТЕРЖИНАН №6 2 УП – ВЫГОДНО ЛЕЧИТЬСЯ, ВЫГОДНО ПРОДАВАТЬ

Запрос потребителя:	Ключевое сообщение для аргументации рекомендации:	Рекомендация:
<b>1. Общий запрос:</b> Тержинан	Длительность лечения Тержиномом не менее 10 дней <sup>1</sup> . Это важное условие эффективного лечения	Тержинан №6 2 уп
<b>2. Детализация 1:</b> я возьму 1 упаковку, возможно, мне не понадобится вторая	Длительность лечения Тержиномом не менее 10 дней <sup>1</sup> . Это важно, чтобы избежать рецидивов в дальнейшем <sup>2</sup>	Тержинан №6 2 уп
<b>3. Детализация 2:</b> я знаю этот препарат. Обычно мне хватает и 1 такой упаковки	Действительно, Тержинан может помочь уже с первого дня лечения <sup>3</sup> . Но, чтобы вылечиться полностью и не иметь рецидивов надо обязательно продолжать лечение не менее 10 дней <sup>4</sup>	Тержинан №6 2 уп




1. Общая характеристика лекарственного препарата Тержинан от 13.09.2022, <http://eec.eaeunion.org/>
2. В.Н.Прилепская, Е.А.Межевитинова, П.Р.Абакарова, Т.В.Бровкина, Ш.М.Погосян . Лечение вульвовагинитов и вагинозов: клиничко-лабораторная эффективность. Гинекология. 2013; 4: 4-9
3. Сидорова И.С., Боровкова Е.А. Результаты сравнительного исследования эффективности применения препаратов местного действия в терапии неспецифических воспалительных заболеваний влагалища. «Российский вестник акушера-гинеколога», том 7, №3, 2007, стр.63-66
4. Стрижаков А.Н., Буданов П.В. Лечение вульвовагинальных инфекций с позиций доказательной медицины. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии 2015, т.14, №1, с69-74

# ТЕРЖИНАН 10 ДНЕЙ – НАДЕЖНОЕ И БЕРЕЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАГИНИТА<sup>1</sup>



РУ ЛП-№(001203)-(РГ-РУ) от 13.09.2022



## ТЕРЖИНАН ПОМОГАЕТ БОЛЕЕ 2,7 МЛН ЖЕНЩИН В РФ ЕЖЕГОДНО<sup>2</sup>

1. В.Н.Прилепская, Е.А.Межевитинова, П.Р.Абакарова, Т.В.Бровкина, Ш.М.Погосян . Лечение вульвовагинитов и вагинозов: клинко-лабораторная эффективность. Гинекология. 2013; 4: 4-9  
2. IQVIA report 2017-2023г среднегодовые продажи Тержинана 2,7 млн упаковок в год